Nombres complexes

exercices

Nombres complexes

Conjugué, Module ...

101 Tangente de l'angle moitié _____ seul

Soit z un nombre complexe qui n'appartient pas à $\mathbb{R}_-$.
Notons θ un argument de z . Montrer que

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z + |z|}.$$

102 Calculs dans $\mathbb{U}$ _____ seul

Soit z_1 et z_2 deux nombres complexes de module 1 tels que $z_1 z_2 \neq -1$. On pose $Z = \frac{z_1 + z_2}{1 + z_1 z_2}$.

1. Montrer que Z est réel.
2. On note θ_1 et θ_2 des arguments des complexes z_1 et z_2 .
Exprimer Z en fonction de θ_1 et θ_2 .

103 Cas d'égalité _____ vendredi 23

Soit z_1, z_2, z_3 trois complexes *non nuls*. Montrer l'équivalence

$$|z_1 + z_2 + z_3| = |z_1| + |z_2| + |z_3| \iff \frac{z_2}{z_1} \in \mathbb{R}^+ \text{ et } \frac{z_3}{z_1} \in \mathbb{R}^+$$

Formule de Moivre, Formule d'Euler

104 Linéarisation _____ seul

Linéariser $\sin^4 x$.

$$\cos \frac{1}{5} - (\cos \frac{1}{8} + \frac{6}{8} \sin \frac{1}{8}) \cos \frac{1}{8}$$

Exprimer $\cos^5 \theta$ et $\sin^5 \theta$ en fonction des $\cos(k\theta)$ et $\sin(k\theta)$ pour $0 \leq k \leq 5$.

Exponentielle complexe

105 Et si on multipliait par e^z ? ! _____ vendredi 23

Résoudre l'équation $e^z + e^{-z} = 2i$.

Résolution d'équations

106 Sans effort _____

Soit $a \in \mathbb{C}$. Résoudre l'équation $z^2 - (1 + a + a^2)z + a + a^3 = 0$.

107 Un système somme-produit _____

Chercher tous les couples $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ vérifiant $\begin{cases} x + y = 3 \\ xy = 2 \end{cases}$.

Combien y a-t-il de solutions ?

108 Vous avez dit « somme-produit » ? _____

Soit $p, q \in \mathbb{C}$ avec $q \neq 0$.

On note z_1 et z_2 les solutions de l'équation $z^2 + pz + q = 0$.

Justifier que z_1 et z_2 sont non nuls, puis déterminer une équation du second degré dont les solutions sont $\frac{1+z_1}{z_2}$ et $\frac{1+z_2}{z_1}$.

109 Une équation du 3^{ème} degré _____
Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 + (1 - i)z^2 - z + 1 - 3i = 0$, après avoir démontré qu'elle possède une solution imaginaire pure.

110 Une équation à paramètre de degré 2 _____
Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Résoudre l'équation $z^2 - 2 \cos \theta z + 1 = 0$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

111 Une équation à paramètre de degré 4 _____
Soit $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
Résoudre l'équation $z^4 - 2 \sin \theta z^2 + \tan^2 \theta = 0$.
Combien a-t-elle de solutions distinctes ?

Racines $n^{\text{ème}}$

112 Racine 7^{ème} de l'unité _____
On pose $z = e^{i\frac{2\pi}{7}}$, $S = z + z^2 + z^4$ et $T = z^3 + z^5 + z^6$.
1. Montrer que $\bar{S} = T$ et $\text{Im } S > 0$.
2. Calculer $S + T$ et ST . En déduire S et T .

113 Une CNS d'inclusion des U_n _____
Soit m et n dans $\mathbb{N}^*$. Montrons que $U_n \subset U_m$ si et seulement si n divise m .

114 Équations plus difficiles _____
Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations
1. $(z + 1)^n = (z - 1)^n$
2. $(z + 1)^n = (1 - z)^n$

Un peu de géométrie

115 Triangle équilatéral _____
Montrer que les points distincts A, B et C , d'affixes a, b et c , forment un triangle équilatéral si et seulement si $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$.

116 Cercle et orthogonalité _____
Soit $a, b \in \mathbb{C}$. On pose $\omega = \frac{a + b}{2}$ et $R = \frac{|b - a|}{2}$.
1. Montrer l'équivalence

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{a\}, \quad \frac{z - b}{z - a} \in i\mathbb{R} \iff |z - \omega|^2 = R^2$$

2. On suppose $a \neq b$ et on note A et B les points d'affixes a et b .
On note Ω le point d'affixe ω .

Pour un point M du plan, déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$ soient orthogonaux.

117 Puissance 1, 2, 3 _____
Déterminer les complexes $z \in \mathbb{C}$ pour que les points d'affixes z, z^2, z^3 :
1. soient alignés ;
2. forment un triangle rectangle ;
3. forment un triangle rectangle et isocèle.

118 Orthocentre _____
Soit A, B, C trois points distincts du cercle trigonométrique, d'affixes respectives a, b, c .
Montrer que le point H d'affixe $h = a + b + c$ est l'orthocentre du triangle ABC , c'est-à-dire le point de concours des hauteurs.

Miscellaneous

119 π , où es-tu ?

Pour tout $n \geq 3$, on pose

$$W_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left| e^{i \frac{2k\pi}{n}} - e^{i \frac{2(k+1)\pi}{n}} \right|$$

1. Donner une interprétation géométrique de W_n et en déduire une conjecture pour la limite de la suite $(W_n)_{n \geq 3}$.
2. Calculer W_3 .
3. Soit $n \geq 3$. Montrer que $W_n = 2n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$.
4. Montrer que la suite $(W_n)_{n \geq 3}$ admet une limite et la déterminer.

120 Équation du 3^{ème} degré

1. Rappeler la définition du nombre complexe j .
Donner un polynôme de degré 2 admettant j pour racine.
Donner également un polynôme de degré 3 à coefficients réels admettant j pour racine.

Soit $(p, q) \in (\mathbb{R}^*)^2$.

On considère l'équation d'inconnue complexe z

$$(E_1) : z^3 + pz + q = 0$$

et l'équation d'inconnue complexe Z

$$(E_2) : Z^2 + qZ - \frac{p^3}{27} = 0$$

On note U et V les solutions de l'équation (E_2) .

On note u une racine cubique de U , c'est-à-dire un nombre **complexe** tel que $u^3 = U$.

2. Exprimer $U + V$ et UV en fonction de p et q .
3. Montrer que $u \neq 0$.

Dans la suite, on pose $v = \frac{-p}{3u}$.

4. Montrer que $v^3 = V$ puis que $u^3 + v^3 = -q$.
5. Montrer que $u + v$ est solution de l'équation (E_1) .
6. Montrer que $ju + j^2v$ et $j^2u + jv$ sont aussi des solutions de l'équation (E_1) .
7. Dans cette question, on suppose que u et v sont **réels distincts**.
Montrer que $ju + j^2v \notin \mathbb{R}$. En déduire que $j^2u + jv \notin \mathbb{R}$, puis que $ju + j^2v \neq j^2u + jv$.
8. Montrer que si $4p^3 + 27q^2 > 0$, l'équation (E_1) admet une racine réelle et une seule.
Indication : on pourra utiliser que pour tout réel A , il existe un unique réel a tel que $a^3 = A$.
9. Montrer que l'équation $z^3 - z - 1 = 0$ admet une unique solution réelle que l'on déterminera à l'aide de radicaux (racine carrée, racine cubique etc.).

121 L'ensemble $\mathbb{Z}[j]$

1. Soit (E) l'équation $z^2 + z + 1 = 0$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.
Donner les solutions de (E) sous forme algébrique et sous forme exponentielle.

Dans la suite du problème, on pose $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$.

2. Soit $z \in \mathbb{C}$.
On écrit z sous la forme $z = a + ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.
(a) Montrer qu'il existe un unique couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $z = x + jy$.

(b) Exprimer $|z|^2$ en fonction de x et de y .

Dans la suite, on note $\mathcal{A}$ l'ensemble

$$\mathcal{A} = \{x + jy, (x, y) \in \mathbb{Z}^2\}$$

ce qui s'écrit encore

$$\mathcal{A} = \{z \in \mathbb{C} \mid \exists (x, y) \in \mathbb{Z}^2, z = x + jy\}$$

3. (a) Montrer que $\mathcal{A}$ est stable par somme, c'est-à-dire que la somme de deux éléments de $\mathcal{A}$ est un élément de $\mathcal{A}$.
 - (b) Montrer que $\mathcal{A}$ est stable par produit, c'est-à-dire que le produit de deux éléments de $\mathcal{A}$ est un élément de $\mathcal{A}$.
 - (c) Montrer que $\mathcal{A}$ est stable pour la conjugaison, c'est-à-dire que si $z \in \mathcal{A}$, alors $\bar{z}$ (le conjugué de z) est dans $\mathcal{A}$.
4. Soit $\mathcal{U}$ l'ensemble suivant

$$\mathcal{U} = \{z \in \mathcal{A} \mid \exists z' \in \mathcal{A}, zz' = 1\}$$

Autrement dit, $\mathcal{U}$ est l'ensemble des complexes z de l'ensemble $\mathcal{A}$ tels qu'il existe z' dans $\mathcal{A}$ vérifiant $zz' = 1$.

- (a) Montrer que $\mathcal{U}$ est stable par produit.
- (b) Soit $z \in \mathcal{A}$. Montrer l'équivalence suivante

$$z \in \mathcal{U} \iff |z|^2 = 1$$

- (c) Montrer que $\mathcal{U}$ contient exactement six éléments que l'on écrira en fonction de j .
Indication, on pourra remarquer que $|z|^2$ peut s'écrire comme la somme de deux carrés.

Nombres complexes

corrigés

Le complexe z n'est pas nul, donc il possède un argument θ .

On remarque que $\operatorname{Re} z + |z| \neq 0$; en effet, sinon on aurait $\operatorname{Re} z = -|z|$, d'où $(\operatorname{Re} z)^2 = |z|^2 = (\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2$, et on aurait donc $\operatorname{Im} z = 0$ et alors $z = \operatorname{Re} z = -|z| \in \mathbb{R}_-$.

Ainsi $\frac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z + |z|}$ est défini et l'on a :

$$\frac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z + |z|} = \frac{|z| \sin \theta}{|z| \cos \theta + |z|} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 1} = \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} = \tan \frac{\theta}{2}.$$

1. On a :

$$\begin{aligned}\bar{Z} &= \frac{\bar{z}_1 + \bar{z}_2}{1 + \bar{z}_1 \bar{z}_2} && \text{règles de calcul des conjugués} \\ &= \frac{\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}}{1 + \frac{1}{z_1} \frac{1}{z_2}} && \text{car } |z_1| = |z_2| = 1 \\ &= Z && \text{en réduisant aux mêmes dénominateurs.}\end{aligned}$$

Comme $Z = \bar{Z}$, on en déduit que Z est réel.

2. On a $z_1 = e^{i\theta_1}$ et $z_2 = e^{i\theta_2}$ avec $\theta_1 + \theta_2 \neq \pi [2\pi]$ car $z_1 z_2 \neq -1$. Donc :

$$Z = \frac{e^{i\theta_1} + e^{i\theta_2}}{1 + e^{i(\theta_1 + \theta_2)}} = \frac{e^{i(\theta_1 + \theta_2)/2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)/2} + e^{i(-\theta_1 + \theta_2)/2}}{e^{i(\theta_1 + \theta_2)/2} e^{-i(\theta_1 + \theta_2)/2} + e^{i(\theta_1 + \theta_2)/2}} = \frac{\cos\left(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}\right)}.$$

— Supposons cette égalité réalisée. On a, par inégalité triangulaire :

$$|z_1 + z_2 + z_3| \leq |z_1 + z_2| + |z_3| \leq |z_1| + |z_2| + |z_3|.$$

Comme les termes extrêmes sont égaux, on a en fait deux égalités.

On a donc :

$$|z_1 + z_2 + z_3| = |z_1 + z_2| + |z_3| \text{ et } |z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|.$$

On utilise alors le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire pour deux nombres complexes.

— Par hypothèse, z_1 et z_2 sont non nuls, donc l'égalité $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ implique l'existence de $u \in \mathbb{R}_+$ tel que $z_2 = u z_1$.

— On a alors $z_1 + z_2 = (1 + u)z_1 \neq 0$, donc l'égalité $|(z_1 + z_2) + z_3| = |z_1 + z_2| + |z_3|$ implique l'existence de $u' \in \mathbb{R}_+$ tel que $z_3 = u'(z_1 + z_2) = u'(1 + u)z_1$.

En posant $v = u'(1 + u)$, on a $v \in \mathbb{R}_+$ et $z_3 = v z_1$.

— Réciproquement, s'il existe u et v dans $\mathbb{R}_+$ tels que $z_2 = u z_1$ et $z_3 = v z_1$, on a :

$$|z_1 + z_2 + z_3| = |(1 + u + v)z_1| = (1 + u + v)|z_1| = |z_1| + u|z_1| + v|z_1| = |z_1| + |z_2| + |z_3|,$$

car u et v sont des réels positifs, donc sont égaux à leur module.

Pour tout $a, b \in \mathbb{C}$, on a :

$$(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

D'où

$$\cos^5 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^5 = \frac{1}{2^5} (e^{i5\theta} + 5e^{3i\theta} + 10e^{i\theta} + 10e^{-i\theta} + 5e^{-3i\theta} + e^{i5\theta}).$$

En regroupant les termes symétriques, on obtient :

$$\begin{aligned} \cos^5 \theta &= \frac{1}{32} ((e^{i5\theta} + e^{-i5\theta}) + 5(e^{3i\theta} + e^{-3i\theta}) + 10(e^{i\theta} + e^{-i\theta})) \\ &= \frac{1}{16} (\cos(5\theta) + 5 \cos(3\theta) + 10 \cos \theta). \end{aligned}$$

De même, on a :

$$\begin{aligned} \sin^5 \theta &= \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^5 = \frac{1}{(2i)^5} (e^{i5\theta} - 5e^{3i\theta} + 10e^{i\theta} - 10e^{-i\theta} + 5e^{-3i\theta} - e^{i5\theta}) \\ &= \frac{1}{32i} ((e^{i5\theta} - e^{-i5\theta}) - 5(e^{3i\theta} - e^{-3i\theta}) + 10(e^{i\theta} - e^{-i\theta})) \\ &= \frac{1}{16} (\sin(5\theta) - 5 \sin(3\theta) + 10 \sin \theta). \end{aligned}$$

Cette équation de degré 2 a nécessairement deux solutions (éventuellement confondues) dans $\mathbb{C}$.
Leur somme vaut $1 + a + a^2$ et leur produit vaut $a + a^3 = a(1 + a^2)$.
Les solutions sont « donc » sont a et $1 + a^2$.

D'après le cours, on a l'équivalence

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \begin{cases} x + y = 3 \\ xy = 2 \end{cases} \iff x, y \text{ solutions de } t^2 - 3t + 2 = 0$$

Or l'équation $t^2 - 3t + 2 = 0$ a deux solutions 1 et 2. Donc les couples solutions sont (1, 2) et (2, 1).
Il y a donc deux solutions !

Le produit des solutions de l'équation $z^2 + pz + q = 0$ vaut q . Ainsi $z_1 z_2 = q$. Or $q \neq 0$, donc les complexes z_1 et z_2 sont non nuls.

On pose

$$Z_1 = \frac{1 + z_1}{z_2} \text{ et } Z_2 = \frac{1 + z_2}{z_1}.$$

On a :

$$Z_1 + Z_2 = \frac{1 + z_1}{z_2} + \frac{1 + z_2}{z_1} = \frac{z_1^2 + z_2^2 + z_1 + z_2}{z_1 z_2} = \frac{(z_1 + z_2)^2 - 2z_1 z_2 + z_1 + z_2}{z_1 z_2}.$$

Comme $z_1 + z_2 = -p$ et $z_1 z_2 = q$, on obtient :

$$Z_1 + Z_2 = \frac{p^2 - 2q - p}{q}.$$

On obtient, de même :

$$Z_1 Z_2 = \frac{1 + z_1 + z_2 + z_1 z_2}{z_1 z_2} = \frac{1 - p + q}{q}.$$

D'après le cours, Z_1 et Z_2 sont les solutions de l'équation :

$$Z^2 - \frac{p^2 - 2q - p}{q} Z + \frac{1 - p + q}{q} = 0.$$

— Si $a \in \mathbb{R}$, alors $a i$ est solution de l'équation si et seulement si

$$-a^3 i - (1 - i) a^2 - a i + 1 - 3i = -a^2 + 1 + i(-a^3 + a^2 - a - 3) = 0,$$

ce qui équivaut à

$$\begin{cases} -a^2 + 1 = 0 \\ -a^3 + a^2 - a - 3 = 0. \end{cases}$$

La première équation donne $a = \pm 1$ et seul -1 convient pour la seconde équation. Ainsi $-i$ est solution de l'équation.

— Il existe $(b, c) \in \mathbb{C}^2$ tel que, pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$z^3 + (1 - i) z^2 - z + 1 - 3i = (z + i)(z^2 + b z + c).$$

On a $(z + i)(z^2 + b z + c) = z^3 + (b + i)z^2 + (c + i b)z + i c$. Il suffit donc que b et c vérifient $b + i = 1 - i$, $c + i b = -1$ et $i c = 1 - 3i$, c'est-à-dire $b = 1 - 2i$ et $c = -3 - i$.

Ainsi z est solution de l'équation si et seulement si $z = -i$ ou $z^2 + (1 - 2i)z - 3 - i = 0$.

On résout l'équation du second degré. On trouve $\Delta = 9$, donc $z = \frac{-1+2i \pm 3}{2}$.

L'ensemble des solutions de l'équation de degré 3 est $\{-i, -2 + i, 1 + i\}$.

Le discriminant de cette équation du second degré est $\Delta = -4 \sin^2 \theta = (2i \sin \theta)^2$.

Les solutions sont donc égales à

$$\frac{-(-2 \cos \theta) \pm 2i \sin \theta}{2} = \cos \theta \pm i \sin \theta = e^{\pm i\theta}$$

Plus précisément :

- Si $\theta \equiv 0 [\pi]$, alors $\Delta = 0$ et l'équation admet une solution double z_0 qui vaut $\begin{cases} z_0 = 1 & \text{si } \theta \equiv 0 [2\pi] \\ z_0 = -1 & \text{si } \theta \equiv \pi [2\pi] \end{cases}$
- Si $\theta \not\equiv 0 [\pi]$, alors $\Delta \neq 0$ et l'équation admet deux solutions distinctes $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$.

Bilan. L'ensemble des solutions de l'équation est donc

$$\begin{array}{ll} \{1\} & \text{si } \theta \equiv 0 [2\pi] \\ \{-1\} & \text{si } \theta \equiv \pi [2\pi] \\ \{e^{i\theta}, e^{-i\theta}\} & \text{si } \theta \not\equiv 0 [\pi] \end{array}$$

On note $\mathcal{E}$ l'équation donnée.

On pose $Z = z^2$ et on résout $Z^2 - 2 \sin \theta Z + \tan^2 \theta = 0$.

Cette équation a pour discriminant

$$\Delta = 4(\sin^2 \theta - \tan^2 \theta) = -\frac{4 \sin^4 \theta}{\cos^2 \theta} = \left(2i \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta}\right)^2.$$

Ses solutions sont donc

$$\frac{1}{2} \left(-(-2 \sin \theta) \pm 2i \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} \right)$$

c'est-à-dire

$$\sin \theta \pm i \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} = \tan \theta (\cos \theta \pm i \sin \theta) = \tan \theta e^{\pm i\theta}$$

Notons Z_1 et Z_2 les deux solutions, qui sont distinctes si et seulement si $\theta \neq 0$:

$$Z_1 = \tan \theta e^{i\theta} \quad \text{et} \quad Z_2 = \tan \theta e^{-i\theta}.$$

— Si $\theta = 0$, alors $Z_1 = Z_2$.

Plus précisément, $Z_1 = Z_2 = 0$.

Donc l'équation $\mathcal{E}$ a une seule solution 0.

— Si $\theta \neq 0$, alors $Z_1 \neq Z_2$.

Plus précisément, Z_1, Z_2 sont non nuls. Donc l'équation $\mathcal{E}$ possède 4 solutions.

— si $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$, alors $\tan \theta > 0$. Donc les formes trigonométriques de Z_1 et Z_2 sont

$$Z_1 = \tan \theta e^{i\theta} \quad \text{et} \quad Z_2 = \tan \theta e^{-i\theta}.$$

Les solutions de $\mathcal{E}$ sont les racines carrées de Z_1 et Z_2 , à savoir :

$$\sqrt{\tan \theta} e^{i\frac{\theta}{2}}, \quad -\sqrt{\tan \theta} e^{i\frac{\theta}{2}}, \quad \sqrt{\tan \theta} e^{-i\frac{\theta}{2}}, \quad -\sqrt{\tan \theta} e^{-i\frac{\theta}{2}}.$$

— si $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, 0[$, alors $\tan \theta < 0$.

Donc les formes trigonométriques de Z_1 et Z_2 sont

$$Z_1 = (-\tan \theta) e^{i(\theta+\pi)} \quad \text{et} \quad Z_2 = (-\tan \theta) e^{-i(\theta+\pi)}.$$

Les solutions de $\mathcal{E}$ sont les racines carrées de Z_1 et Z_2 , à savoir :

$$\sqrt{-\tan \theta} e^{i\frac{\theta+\pi}{2}}, \quad -\sqrt{-\tan \theta} e^{i\frac{\theta+\pi}{2}}, \quad \sqrt{-\tan \theta} e^{-i\frac{\theta+\pi}{2}}, \quad -\sqrt{-\tan \theta} e^{-i\frac{\theta+\pi}{2}}.$$

1. On a :

$$\bar{S} = \bar{z} + \bar{z}^2 + \bar{z}^4 = e^{-i\frac{2\pi}{7}} + e^{-i\frac{4\pi}{7}} + e^{-i\frac{8\pi}{7}} = e^{i\frac{12\pi}{7}} + e^{i\frac{10\pi}{7}} + e^{i\frac{6\pi}{7}} = z^6 + z^5 + z^3 = T$$

D'autre part, on a :

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} S &= \sin \frac{2\pi}{7} + \sin \frac{4\pi}{7} + \sin \frac{8\pi}{7} = \sin \frac{2\pi}{7} + \sin \frac{3\pi}{7} - \sin \frac{\pi}{7} \\ &= \left(\sin \frac{2\pi}{7} - \sin \frac{\pi}{7} \right) + \sin \frac{3\pi}{7} > 0, \end{aligned}$$

car la fonction $\sin$ est croissante et positive sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

2. On a, puisque $z \neq 1$:

$$S + T = \sum_{k=0}^6 z^k - 1 = \frac{1 - z^7}{1 - z} - 1 = -1,$$

car $z^7 = e^{i2\pi} = 1$.

On a, en utilisant le fait que $z^7 = 1$:

$$\begin{aligned} ST &= z^4 + z^6 + z^7 + z^5 + z^7 + z^8 + z^7 + z^9 + z^{10} \\ &= z^4 + z^6 + 1 + z^5 + 1 + z + 1 + z^2 + z^3 \\ &= S + T + 3 = 2. \end{aligned}$$

Ainsi S et T sont les solutions de l'équation $x^2 + x + 2 = 0$.

Le discriminant est -7 et les racines $\frac{-1 \pm i\sqrt{7}}{2}$.

Comme $\operatorname{Im} S > 0$, on a :

$$S = \frac{-1 + i\sqrt{7}}{2} \quad \text{et} \quad T = \frac{-1 - i\sqrt{7}}{2}.$$

-
- Supposons $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}_m$. Alors, en particulier $e^{\frac{2i\pi}{n}} \in \mathbb{U}_m$, donc $\left(e^{\frac{2i\pi}{n}}\right)^m = e^{\frac{2mi\pi}{n}} = 1$. On en déduit que $\frac{2m\pi}{n}$ est un multiple de 2π donc n divise m .
 - Supposons que n divise m . Alors il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $m = np$.
Soit $z \in \mathbb{U}_n$. On a $z^n = 1$. On en déduit $z^m = (z^n)^p = 1$, donc $z \in \mathbb{U}_m$.
On a donc $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}_m$.

Le triangle équilatéral ABC est dit direct (resp. indirect) si l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ a pour mesure $\frac{\pi}{3}$ (resp. $-\frac{\pi}{3}$).

Le triangle ABC est équilatéral si et seulement si, il est équilatéral direct ou équilatéral indirect.

- Le triangle ABC est équilatéral direct si et seulement si C est l'image de B par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$, ce qui s'écrit :

$$(c - a) = e^{i\frac{\pi}{3}}(b - a) = -j^2(b - a)$$

D'où $c = a - j^2(b - a)$. On a donc

$$\begin{aligned} aj + bj^2 + c &= aj + bj^2 + (a - j^2(b - a)) \\ &= a(1 + j + j^2) \\ &= 0 \end{aligned}$$

- De même ABC est équilatéral indirect si et seulement si

$$(c - a) = e^{-i\frac{\pi}{3}}(b - a) = -j(b - a)$$

De la même façon, on trouve $aj^2 + bj + c = 0$.

Le triangle ABC est équilatéral si et seulement si

$$aj + bj^2 + c = 0 \quad \text{ou} \quad aj^2 + bj + c = 0$$

c'est-à-dire si et seulement si

$$(aj + bj^2 + c)(aj^2 + bj + c) = 0.$$

Après simplification, en utilisant $1 + j + j^2 = 0$ et $j^3 = 1$, on obtient la condition

$$a^2 + b^2 + c^2 - (bc + ac + ab) = 0$$

1. Soit $z \neq a$.

D'une part, on a

$$\begin{aligned} \frac{z-b}{z-a} \in i\mathbb{R} &\iff \frac{\bar{z}-\bar{b}}{\bar{z}-\bar{a}} = -\frac{z-b}{z-a} \\ &\iff (\bar{z}-\bar{b})(z-a) = -(\bar{z}-\bar{a})(z-b) \\ &\iff 2z\bar{z} - z(\bar{a}+\bar{b}) - \bar{z}(a+b) + (\bar{a}b - a\bar{b}) = 0 \\ &\iff z\bar{z} - z\bar{\omega} - \bar{z}\omega + \frac{1}{2}(\bar{a}b - a\bar{b}) = 0. \end{aligned}$$

D'autre part, on a :

$$\begin{aligned} |z-\omega|^2 = R^2 &\iff (z-\omega)(\bar{z}-\bar{\omega}) - \frac{|b-a|^2}{4} = 0 \\ &\iff z\bar{z} - z\bar{\omega} - \bar{z}\omega + \omega\bar{\omega} - \frac{|b-a|^2}{4} = 0 \end{aligned}$$

Reste à montrer que $\omega\bar{\omega} - \frac{|b-a|^2}{4} = \frac{1}{2}(\bar{a}b - a\bar{b})$. On a

$$\omega\bar{\omega} - \frac{|b-a|^2}{4} = \frac{1}{4}(a+b)(\bar{a}+\bar{b}) - \frac{1}{4}(b-a)(\bar{b}-\bar{a}) = \frac{1}{2}(\bar{a}b - a\bar{b}).$$

2. Soit $M \neq A$. On a l'équivalence :

$$\overrightarrow{MA} \perp \overrightarrow{MB} \iff \frac{z-b}{z-a} \in i\mathbb{R} \iff |z-\omega|^2 = R^2 \iff M\Omega^2 = R^2$$

La dernière égalité est équivalente au fait que M appartient au cercle de centre Ω et de rayon R , ou encore au cercle de diamètre $[AB]$.

On note M_1, M_2, M_3 les points d'affixes z, z^2, z^3 .

1. Si $z = 1$ ou $z = 0$, les points sont confondus donc alignés ; sinon, ils sont alignés si et seulement si $\frac{z^3 - z}{z^2 - z} = z + 1$ est réel, ce qui équivaut à z réel. Comme 0 et 1 sont réels, on conclut que les trois points sont alignés si et seulement si z est réel.
2. On suppose que les points sont distincts, c'est-à-dire que $z \in \mathbb{C} \setminus \{-1, 0, 1\}$.
 - Le triangle $M_1M_2M_3$ est rectangle en M_1 si et seulement si $\frac{z^3 - z}{z^2 - z} = z + 1$ est imaginaire pur. Cela équivaut à $\operatorname{Re}(z) = -1$, donc au fait que M_1 appartient à la droite d_1 d'équation $x = -1$.
 - De même, $M_1M_2M_3$ est rectangle en M_2 si et seulement si $\frac{z^3 - z^2}{z - z^2} = -z$ est imaginaire pur. Cela équivaut à $\operatorname{Re}(z) = 0$, donc au fait que M_1 appartient à la droite d_2 d'équation $x = 0$.
 - De même, $M_1M_2M_3$ est rectangle en M_3 si et seulement si $\frac{z - z^3}{z^2 - z^3} = 1 + \frac{1}{z}$ est imaginaire pur.

En notant $z = x + iy$, avec x et y réels, on a les équivalences :

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{z} \in i\mathbb{R} &\iff 1 + \frac{1}{z} = -1 - \frac{1}{z} \\ &\iff 2z\bar{z} = -(z + \bar{z}) \\ &\iff x^2 + y^2 = -x \\ &\iff \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

On reconnaît l'équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre Ω , d'affixe $-\frac{1}{2}$ et de rayon $\frac{1}{2}$ (ce cercle est tangent aux droites d_1 et d_2).

La condition équivaut donc au fait que M_1 appartient au cercle $\mathcal{C}$.

Finalement le triangle $M_1M_2M_3$ est rectangle si et seulement si M_1 appartient à

$$d_1 \cup d_2 \cup \mathcal{C} \setminus \{O, A\}$$

où A est le point d'affixe -1 .

3. En plus d'être imaginaire pur, il faut que dans chacun des cas précédents, le rapport soit de module 1. Ce qui donne, dans le premier cas $z + 1 = \pm i$, dans le second cas $z = \pm i$ et dans le troisième cas $1 + \frac{1}{z} = \pm i$. Finalement le triangle $M_1M_2M_3$ est rectangle et isocèle si et seulement si z appartient à :

$$\left\{-1 - i, -1 + i, -i, i, \frac{1}{2}(-1 - i), \frac{1}{2}(-1 + i)\right\}.$$

Il s'agit de démontrer que $\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC}$, les deux autres relations d'orthogonalité obtenues par permutations circulaires s'en déduisant par symétrie. On a :

$$\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC} \iff \frac{h-a}{c-b} \in i\mathbb{R} \iff \frac{c+b}{c-b} \in i\mathbb{R}.$$

On a, puisque b et c appartiennent à $\mathbb{U}$:

$$\overline{\left(\frac{c+b}{c-b}\right)} = \frac{\bar{c} + \bar{b}}{\bar{c} - \bar{b}} = \frac{\frac{1}{c} + \frac{1}{b}}{\frac{1}{c} - \frac{1}{b}} = \frac{b+c}{b-c} = -\frac{c+b}{c-b}.$$

Ainsi $\frac{h-a}{c-b} \in i\mathbb{R}$ et donc $\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC}$.

1. W_n est le périmètre du polygone dont les sommets sont les points d'affixes $e^{i\frac{2k\pi}{n}}$ pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Ce polygone est inscrit dans le cercle trigonométrique.

Quand n tend vers l'infini, ce polygone se rapproche du cercle.

Ainsi, on conjecture que la suite (W_n) converge et a pour limite 2π .

2. $W_3 = |1 - j| + |j - j^2| + |j^2 - 1|$ est exactement le périmètre du triangle (équilatéral) dont les sommets sont les points d'affixes $1, j, j^2$.

Sur un dessin, il est facile de voir que $|j - j^2| = \sqrt{3}$.

Donc $W_3 = 3\sqrt{3}$.

3. Pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, on a (en factorisant) :

$$\left| e^{i\frac{2k\pi}{n}} - e^{i\frac{2(k+1)\pi}{n}} \right| = \left| e^{i\frac{2k\pi}{n}} \left(1 - e^{i\frac{2\pi}{n}} \right) \right| = \left| 1 - e^{i\frac{2\pi}{n}} \right|$$

d'où

$$W_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left| e^{i\frac{2k\pi}{n}} - e^{i\frac{2(k+1)\pi}{n}} \right| = \sum_{k=0}^{n-1} \left| 1 - e^{i\frac{2\pi}{n}} \right| = n \left| 1 - e^{i\frac{2\pi}{n}} \right| \stackrel{\text{WHY}}{=} 2n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

4. Par un jeu d'écriture, on obtient

$$W_n = 2\pi \times \frac{\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)}{\frac{\pi}{n}}$$

On a

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{n} = 0 \\ \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = 1 \end{cases} \quad \text{d'où, par composition de limites,} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)}{\frac{\pi}{n}} = 1$$

D'où

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n = 2\pi$$

- $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. Les polynômes $X^2 + X + 1$ et $X^3 - 1$ admettent j pour racine.
- Comme U et V sont les solutions de (E_2) , on a $(Z-U)(Z-V) = Z^2 + qZ - \frac{p^3}{27}$. D'où $U+V \stackrel{\clubsuit}{=} -q$ et $UV \stackrel{\spadesuit}{=} -\frac{p^3}{27}$.
- Raisonnons par l'absurde. Si $u = 0$ alors $u^3 = 0$ donc $U = 0$, donc $p = 0$ (d'après $\spadesuit$), ce qui n'est pas d'après l'énoncé.
Ainsi, $u \neq 0$.
- Le complexe v vérifie par définition l'égalité $3uv = -p$. En élevant au cube, on obtient $27u^3v^3 = -p^3$, d'où (d'après $\spadesuit$) $u^3v^3 = UV$. Or $u^3 = U \neq 0$, donc $v^3 = V$.
- Remarquons que $u^3 + v^3 = -q$ (d'après $\clubsuit$) et rappelons que $3uv = -p$ (cf. la définition de v).
Ainsi :

$$(u+v)^3 + p(u+v) + q = u^3 + 3u^2v + 3uv^2 + v^3 + p(u+v) + q = \underbrace{(u^3 + v^3)}_{-q} + \underbrace{3uv}_{-p}(u+v) + p(u+v) + q = 0$$

- Montrer que $ju + j^2v$ et $j^2u + jv$ sont aussi des solutions de l'équation (E_1) .

1ère solution (par le calcul) Avant de commencer, notons que $ju + j^2v = j(u + jv)$ et que $j^3 = 1$. Ainsi, il suffit de reprendre le calcul précédent et de remplacer v par jv .

$$(j(u + jv))^3 + pj(u + jv) + q = \underbrace{(u^3 + v^3)}_{-q} + \underbrace{3ujv}_{-pj}(u + jv) + pj(u + jv) + q = 0$$

On montre de même que $j^2u + jv$ est solution.

2ème solution (moins calculatoire et plus conceptuelle ?)

Nous venons de montrer que

$$\text{si } (u, v) \text{ vérifie } \begin{cases} u^3 = U \\ v = \frac{-p}{3u} \end{cases} \text{ alors } u + v \text{ est solution de } (E_1)$$

Fixons donc un tel couple (u, v) (qui existe d'après les questions précédentes).

Alors le couple (ju, j^2v) vérifie les 2 égalités de l'accolade ci-dessus. En effet, on a :

$$\begin{cases} (ju)^3 = U & (\text{car } j^3 = 1 \text{ et } u^3 = U) \\ j^2v = \frac{-p}{3(ju)} & (\text{car } 1/j = j^2 \text{ et } v = \frac{-p}{3u}) \end{cases}$$

Donc, d'après l'implication ci-dessus, $(ju) + (j^2v)$ est solution de (E_1) .

- On a $ju + j^2v = ju + (-1 - j)v = -v + j(u - v)$. On écrit $j = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Ainsi $\text{Im}(ju + j^2v) = \frac{\sqrt{3}}{2}(u - v) \neq 0$ car $u \neq v$. Donc $ju + j^2v \notin \mathbb{R}$.

Comme $\overline{ju + j^2v} = j^2u + jv$, on obtient que $j^2u + jv \notin \mathbb{R}$ et que $ju + j^2v \neq j^2u + jv$

- Supposons $4p^3 + 27q^2 > 0$.

Alors l'équation (E_2) admet deux solutions **réelles distinctes** U et V .

Il existe alors une unique racine cubique **réelle** u de U , c'est-à-dire telle que $u^3 = U$.

Choisissons également l'unique réel v tel que $v^3 = V$.

On sait alors que $z_0 = u + v$, $z_1 = ju + j^2v$ et $z_2 = j^2u + jv$ sont des solutions de (E_1) .

Comme $U \neq V$, on a $u \neq v$, donc (d'après la question précédente) $z_1, z_2 \notin \mathbb{R}$ et $z_1 \neq z_2$.

Ainsi z_0, z_1, z_2 sont exactement les solutions de (E_1) (car l'équation est de degré 3) et seule z_0 est réelle.

Par conséquent (E_1) admet bien une seule racine réelle.

- Montrer que l'équation $z^3 - z - 1 = 0$ admet une unique solution réelle que l'on déterminera à l'aide de radicaux (racine carrée, racine cubique etc.).

Ici $p = -1$ et $q = -1$. Comme $4p^3 - 27q^2 > 0$, l'équation admet une unique solution réelle (à savoir $u + v$, où $u = \sqrt[3]{U}$ et $v = \sqrt[3]{V}$ avec U et V les deux solutions réelles distinctes de (E_2)).

$$\text{Les solutions de } (E_2) \text{ sont } U, V = \frac{1 \pm \sqrt{\frac{23}{27}}}{2}.$$

$$\text{Donc l'unique solution réelle de } (E_1) \text{ est } \sqrt[3]{\frac{1 + \sqrt{\frac{23}{27}}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{1 - \sqrt{\frac{23}{27}}}{2}}$$